Observation Sur une plaie darmes a feu

n.° 28.

quoique lacademie soit riche en observations sur les plaies darmes a feu, je me persuade néamoins quelle ne me seaura pas mauvois gré de rapporter celle cy; Le 16 may 1765. a une heure aprés minuit je fus apellé pour secourir le nommé Louis d'Epinal domestique garcon âgé de 16 ans de paris paroisse St jacques la boucherie, Lequel en sortant d'un second etage recu trois coups de fusils par les sentinels destinées a garder le canton de force; le premier coup fut donné a la partie moyenne et interne de la cuisse droite, la balle parcourut toutes les parties comprises depuis cette region en se portant un peu obliquement le long des vaisseaux cruraux, jusqua langle de la fesse d'ou elle sortit; toute la masse formée par les muscles de la jambe etoit mutilée et contuse, lentrée de la plaie etoit d'une largeur mediocre, la sorti beaucoup plus petite mais cauterisée et contuse, je passai une sonde dans cette plaie a dessin de massurer s'il ny avoit pas détoffe, je ne reconnu aucun corps etranger, mais les muscles me parurent dilacérés machés et dans un etat de refoulement j'y passai un seton je le fesois alternativement aller en haut et en bas, afin de donner la facilité aux parcelles

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

ARC 59
n° 027

des corps etrangers, de sortir aisement. j'eus l'attention de scarifier la circonférance de l'entrée de la plaie, et j'incirai la sortie afin de debrider sufisenment pour prevenir les accidents; Le Second Coup de fusil qui lui fut adressé penetra a la region hypocondre droite un peu anterieurement, — precisement au voisinage du rebord cartilagineux des fausses costes, environ a quatre travers de doigts du cartilage xyphoide, la balle se porta lateralement et obliquement sur les deux derniers fausse costes, elle les fracassa; la onzieme paroissoit la plus endomagé, j'y sentis plusieurs petites esquilles, que je remis en place autent quil fut possible, j'en retirai même une petite parcelle, la balle — sortit a la partie lateralle des lombes emediatement au dessus de la tuberosité de l'os des isles, la plaie par — l'examain que j'en fis netoit point penetrante dans la capacité du bas ventre, je crus devoir observer la même manœuvre qu'en la plaie de la cuisse; Le 3e coup fut porté entre les doigts du millieu et l'annullère du même côté des autres blessures, une parties de ses deux doigts fut emportée sens rien diminuer de la longeur des derniers phalenges; je pansai ces trois plaies en premier appareil avec de l'eau marinée, je fis saigner le malade afin de prevenir les accidents, je le mis a une diete severe les premiers jours, le lendemain je fis voir le malade a M. Contaroz pour prendre son conseil, il pansa comme moi quil

fallroit insister sur le regime que j'avois prescrit, et il
trouva ses playes dans l'état ou elle pourvient être en
pareil cas ; quatre joures après il survin une —
tumefaction considerable a la cuisse, qui ceda —
aisement a l'usage des sagnées et des lotions resolutives ;
celle de la capacité du bas ventre fut accompagnée
de fièvre d'alteration et de gonflement qui s'elandoit
sur cette capacité, la suppuration s'etablit par l'usage
des pansements methodiques, et detacha les escharres —
produites par les balles ; au bout de quinze joures
la regeneration des chairs se faisant sensiblement je
retirai les Setons que j'avois eu soin d'oindie a —
chaque pansement ; après un mois de traitement
le malade a été gueri radicalement, il est encore
existent dans la maison aux nombres des prisonniers.

Colon

pr. Chirurgien de Bicêtre.

Le 19 xbre 1365.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE